

Plik pobrany ze strony <http://www.aestetica.pl>

## Korekcja kształtu piersi - Mastopeksja (Mastopeksy)



**PRZED**



**PO**

[więcej zdjęć](#)

**Korekcja kształtu piersi ( Mastopeksja )** polega na podniesieniu i poprawie kształtu piersi przez usunięcie nadmiaru skóry i modelowanie tkanki gruczołu piersiowego. Otoczka zostaje przeniesiona wyżej (przy nadmiernym jej rozciągnięciu może również zostać zmniejszona).

**Mastopeksja**, może być wykonana z cięcia wokół otoczki, z pionową blizną do fałdu podpiersiowego lub z blizną w kształcie kotwicy.

W sytuacji zaniku gruczołu (np. po karmieniu), efekt operacji można dodatkowo poprawić stosując implanty piersiowe.

Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Długość operacji:	1-3 godziny.
Znieczulenie:	Miejscowe wraz z środkami uspokajającymi lub ogólne.
Pobyt w klinice:	1-3 dni.
Efekty uboczne:	Czasowa opuchlizna, zmiany w wrażliwości brodawki sutkowej. Trwałe blizny.
Ryzyko:	Grube, szerokie blizny, utrata skóry. Infekcje. Niejednakowy układ brodawek sutkowych. Trwała utrata czucia w brodawkach lub w piersiach.
Rekonwalescencja:	Opatrunek: 7-10 dni. Zdjęcie szwów: po ok. 7-10 dniach. Biustonosz pooperacyjny: ok. miesiąc. Powrót do pracy: tydzień lub więcej. Bardzo intensywne zajęcia: miesiąc. Dojrzewanie blizn: kilka miesięcy do roku (Twarde, czerwone blizny stopniowo stają się coraz bledsze i mniej widoczne. Nigdy jednak całkowicie nie znikają.).
Trwałość efektu końcowego:	Zróznicowana. Grawitacja, ciąża, starzenie się czy zmiana wagi mogą doprowadzić do ponownego obwisania piersi. Rezultaty operacji mogą zostać przedłużone i polepszone przez użycie protez piersiowych oraz odpowiednią profilaktykę (np. sportowy biustonosz) w czasie zwiększonej aktywności fizycznej.
Zdjęcia:	<a href="#">Przykładowe zdjęcia</a>