

Plik pobrany ze strony <http://www.aestetica.pl>

## Powiększanie piersi (Augmentation Mammoplasty)



**PRZED**



**PO**

[więcej zdjęć](#)

**Powiększanie piersi** polega na wprowadzeniu wkładek piersiowych pod gruczoł piersiowy lub pod mięsień piersiowy większy. Umieszczenie pod mięśniem pozwala u osób szczupłych poprawia kształt piersi, bez nadmiernego wypełnienia górnej części piersi.

Wkładki wypełnione są silikonem o konsystencji żelu, mają kształt anatomiczny lub okrągły, są różnej wielkości, produkowane przez kilku producentów: najczęściej stosowane są implanty firm - Mentor, McGhan, Nagor.

Nacięcia dokonuje się w bruzdzie podpiersiowej lub okołotoczkowo. Cięcie w bruzdzie podpiersiowej pozwala na zachowanie możliwości karmienia piersią.

Dobór wielkości i rodzaju implantów zależy od wspólnej decyzji lekarza i pacjentki. Jest ona uwarunkowana przede wszystkim budową ciała, stanem i wielkością własnych piersi, zrozumieniem ograniczeń i możliwości powikłań po powiększeniu, planowanym długotrwałym, jak najlepszym efektem operacji.

Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Długość operacji:	1-2 godziny.
Znieczulenie:	Ogólne.
Pobyt w klinice:	1-2 dni.
Efekty uboczne:	Czasowe odczucie bólu, opuchlizna, zmiany w wrażliwości brodawki sutkowej. Zwiększona wrażliwość piersi na dotyk przez kilka tygodni.
Ryzyko:	Formowanie się blizny wokół protezy, które może spowodować napięcie i twardość piersi. Krwawienie. Infekcja. Zwiększenie lub zmniejszenie wrażliwości brodawki sutkowej oraz skóry (rzadko trwałe). Uszkodzenie protezy (naruszenie integralności torebki wymaga operacyjnego usunięcia i wymiany na inny - w tym wypadku firma produkująca implanty wymienia implant na nowy).
Rekonwalescencja:	Powrót do pracy: kilka dni. Ból przy kontakcie z piersiami: 3-4 tygodnie. Dojrzewanie blizn: kilka miesięcy do roku. Wymagany jest specjalny biustonosz pooperacyjny lub biustonosz sportowy.
Trwałość efektu końcowego:	Protezy mogą wymagać usunięcia lub wymiany - np. w skutek uszkodzenia lub życzenia zmiany wielkości piersi lub poprawy kształtu po kilku latach.
Zdjęcia:	<a href="#">Przykładowe zdjęcia</a>